No.	プロトコル名
1	≪AC≫ ADM + CPA (60/600)
2	≪ddAC≫ dose dense ADM + CPA (60/600)
3	≪EC≫ EPI + CPA (90/600)
4	Weekly PTX (80) (連投用)
5	dose dense PTX (175)
6	≪CMF≫ CPA + MTX + 5-FU (100/40/600) (エンドキサン)
7	≪FEC100≫ 5-FU + EPI + CPA (500/100/500)
8	Weekly PTX + BV (90/10)
9	ハラヴェン (1.4)
10	≪CbG≫ CBDCA + GEM (2/1000)
11	GEM (1250)
12	Tri-weekly DOC (75)
13	DOC + CPA (70/600)
14	VNR (25)
15	CPT-11 (100)
16	PTX + GEM (175/1250)
17	Tri-weekly アブラキサン (260)
18	ハーセプチン (4→2)
19	Tri-weekly ハーセプチン (8→6)
20	Weekly ハーセプチン + PTX (4→2/80) (連投用)
21	ハーセプチン + GEM (8→6/1250)
22	ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)
23	ハーセプチン + VNR (8→6/25)
24	ハーセプチン (4→2) (ゼローダ)
25	Tri-weekly DOC + ハーセプチン (75/8→6)
26	パージェタ + ハーセプチン (840→420/8→6)
27	パージェタ + ハーセプチン + PTX (840→420/8→6/80)
28	Tri-weekly パージェタ + ハーセプチン + DOC (840→420/8→6/75)
29	パージェタ + ハーセプチン + VNR (840→420/8→6/25)
30	パージェタ + ハーセプチン + ハラヴェン (840→420/8→6/1.4)
31	カドサイラ (3.6)
32	エンハーツ (5.4)
33	アブラキサン + テセントリク (100/840)

1

≪AC≫ ADM + CPA (60/600)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
4	大塚生食注	50	mL	点滴（全開）		11:00	5	分	○																				
	アドリアシン注	60	mg/㎡																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	エンドキサン注射用	600	mg/㎡																										

2

≪ddAC≫ dose dense ADM + CPA (60/600)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○													
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																			
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																			
	デキサート注射液	12	mg																			
4	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○													
	アドリアシン注	60	mg/㎡																			
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○													
	エンドキサン注射用	600	mg/㎡																			
	※ジーラスタ皮下注を併用																					

3

≪EC≫ EPI + CPA (90/600)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
4	大塚生食注 50mL	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
	エピルビシン塩酸塩注射用	90	mg/㎡																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	エンドキサン注射用	600	mg/㎡																										

4

Weekly PTX (80) (連投用)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○						
2	大塚生食注 100mL	100	mL	点滴		10:00	30	分	○						
	デキサート注射液	8	mg												
	ファモチジン注射用	20	mg												
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○						
4	大塚糖液 5% 250mL	250	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	1	時間	○						
	パクリタキセル注	80	mg/㎡												

5

dose dense PTX (175)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○													
	デキサート注射液	20	mg																			
	ファモチジン注射用	20	mg																			
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○													
4	テルモ生食	500	mL	点滴		11:00	3	時間	○													
	パクリタキセル注	175	mg/㎡																			
	※ジーラスタ皮下注を併用																					

6

≪CMF≫ CPA + MTX + 5-FU (100/40/600) (エンドキサン)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○																				
	デキサート注射液	4	mg																																	
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○																				
	メソトレキセート注射用	40	mg/㎡																																	
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:00	30	分	○							○																				
	５－ＦＵ注	600	mg/㎡																																	
	※エンドキサン内服 100mg/㎡ d1-14																																			

7

≪FEC100≫ 5-FU + EPI + CPA (500/100/500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
4	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
	エピルビシン塩酸塩注射用	100	mg/㎡																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	エンドキサン注射用	500	mg/㎡																										
6	大塚生食注	50	mL	点滴		11:35	15	分	○																				
	５－ＦＵ注	500	mg/㎡																										

ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)

8

Weekly PTX + BV (90/10)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○							○													
	デキサート注射液	8	mg																																	
	ファモチジン注射用	20	mg																																	
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○							○													
4	大塚糖液 5%	250	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	1	時間	○							○							○													
	パクリタキセル注	90	mg/㎡																																	
5	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	12:00	1.5	時間	○														○													
	アバスチン点滴静注用	10	mg/kg																																	

9

ハラヴェン (1.4)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30			○							○													
	ハラヴェン静注	1.4	mg/㎡																										

≪CbG≫ CBDCA + GEM (2/1000)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1000	mg/㎡																										
4	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	1	時間	○							○													
	カルボプラチン点滴静注液	2	AUC																										

11

GEM (1250)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1250	mg/㎡																										

12

Tri-weekly DOC (75)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	75	mg/㎡																										

13

DOC + CPA (70/600)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	70	mg/㎡																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	15	分	○																				
	エンドキサン注射用	600	mg/㎡																										

14

VNR (25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○							○													
	ロゼウス静注液	25	mg/㎡																										
4	ソルデム3A	200	mL	点滴		10:35	20	分	○							○													

15

CPT-11 (100)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○							○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	8	mg																																	
3	テルモ生食	500	mL	点滴		10:30	1.5	時間	○							○							○													
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/㎡																																	

16

PTX + GEM (175/1250)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	20	mg																										
	ファモチジン注射用	20	mg																										
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分								○													
	デキサート注射液	4	mg																										
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																				
5	テルモ生食	500	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	3	時間	○																				
	パクリタキセル注	175	mg/㎡																										
6	大塚生食注	100	mL	点滴		14:00	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1250	mg/㎡																										

Tri-weekly アブラキサン (260)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	（投与量に応じて）		点滴		10:30	30	分	○																				
	アブラキサン点滴静注用	260	mg/㎡																										

ハーセプチン（4→2）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○						
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○						
	ハーセプチン注射用	4	mg/kg												
	※2回目以降2mg/kg														

19

Tri-weekly ハーセプチン (8→6)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

Weekly ハーセプチン + PTX (4→2/80) (連投用)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○						
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○						
	ハーセプチン注射用	4	mg/kg												
	※2回目以降2mg/kg														
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	30	分	○						
	デキサート注射液	8	mg												
	ファモチジン注射用	20	mg												
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		12:00	30	分	○						
5	大塚生食注	250	mL	点滴		12:30	1	時間	○						
	パクリタキセル注	80	mg/㎡												

21

ハーセプチン + GEM (8→6/1250)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1250	mg/㎡																										
4	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	11:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	グラニセトロン点滴静注液3mg	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30			○							○													
	ハラヴェン静注	1.4	mg/㎡																										
4	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:35	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

23

ハーセプチン + VNR (8→6/25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
4	大塚生食注	50	mL	点滴		12:00	5	分	○							○													
	ロゼウス静注液	25	mg/㎡																										
5	ソルデム3A	200	mL	点滴		12:05	20	分	○							○													

ハーセプチン（4→2）（ゼローダ）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○							○						
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○							○							○							○						
	ハーセプチン注射用	4	mg/kg																																	
	※2回目以降2mg/kg																																			
	※ゼローダ内服 d1-21																																			

Tri-weekly DOC + ハーセプチン (75/8→6)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴（任意速度）		10:00																							
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	75	mg/㎡																										
4	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	11:30	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用 150mg（希釈液なし）	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

パージェタ ＋ ハーセプチン (840→420/8→6)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	パージェタ点滴静注	840	mg																										
	※2回目以降420mg																												
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:00	1	時間	○																				
4	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	12:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

27

パージェタ + ハーセプチン + PTX (840→420/8→6/80)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○							○						
	デキサート注射液	8	mg																										
	ファモチジン注射用	20	mg																										
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○							○						
4	大塚糖液 5%	250	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	1	時間	○							○							○						
	パクリタキセル注	80	mg/㎡																										
5	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	12:00	1	時間	○																				
	パージェタ点滴静注	840	mg																										
	※2回目以降420mg																												
6	大塚生食注	100	mL	点滴		13:00	1	時間	○																				
7	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	14:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												

Tri-weekly パージェタ + ハーセプチン + DOC (840→420/8→6/75)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:30	1	時間	○																				
	パージェタ点滴静注	840	mg																										
	※2回目以降420mg																												
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	1	時間	○																				
5	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	11:30	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												
6	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		13:00	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	75	mg/㎡																										

ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)

パージェタ + ハーセプチン + VNR (840→420/8→6/25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	840	mg																										
	※2回目以降420mg																												
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:00	1	時間	○																				
4	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	12:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												
5	大塚生食注	100	mL	点滴		13:30	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
6	大塚生食注	50	mL	点滴		14:00	5	分	○							○													
	ロゼウス静注液	25	mg/㎡																										
7	ハーセプチン + ハラヴェン (8→6/1.4)	200	mL	点滴		14:05	20	分	○							○													

パージェタ + ハーセプチン + ハラヴェン (840→420/8→6/1.4)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	パージェタ点滴静注	840	mg																										
	※2回目以降420mg																												
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:00	1	時間	○																				
4	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	12:00	1.5	時間	○																				
	ハーセプチン注射用	8	mg/kg																										
	※2回目以降6mg/kg																												
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		13:30	30	分	○							○													
6	大塚生食注	50	mL	点滴		14:00	5	分	○							○													
	ハラヴェン静注	1.4	mg/㎡																										

カドサイラ (3.6)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mg	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:30	1.5	時間	○																				
	カドサイラ点滴注射用	3.6	mg/kg																										

エンハーツ (5.4)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	大塚糖液 5%	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚糖液 5% 50mL	50	mL	点滴		10:30	10	分	○																				
4	大塚糖液 5%	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:40	1.5	時間	○																				
	エンハーツ点滴静注用	5.4	mg/kg																										
5	大塚糖液 5%	50	mL	点滴		12:10	10	分	○																				

アブラキサン + テセントリク (100/840)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○													
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○														○													
	テセントリク点滴静注	840	mg																																	
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○														○													
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		11:05	30	分	○							○							○													
	デキサート注射液	4	mg																																	
5	大塚生食注	(投与量に応じて)		点滴		11:35	30	分	○							○							○													
	アブラキサン点滴静注用	100	mg/㎡																																	